



【weekly パクリタキセル療法について】



様



コース目

お薬の名前と治療のスケジュール (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
レスタン錠	過敏症を抑えるお薬です	1日1回 内服 30分	5錠							5錠						5錠															
ファモチジン注 デキサート注	抗がん剤です	1時間																													
パクリタキセル注																															

治療による副作用

: 注意が必要な時期

自覚症状	過敏症	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
	過敏症																													
	食欲不振・吐き気																													
	筋肉痛・関節痛																													
	口内炎																													
	手足のしびれ																													
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																													
検査値	白血球減少																													
	赤血球減少(貧血)																													
	血小板減少																													
	肝機能低下																													



* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。

* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したもので、必ずこの通りになると限りません。

* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。

* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。