




【ゲムシタビン療法(隔週)について】



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目	
薬の名前	作用	めやすの時間																
デキサート注	吐き気止めです	30分								<p>この週はお休みです。</p>								
ゲムシタビン注	抗がん剤です	30分																

😊 治療による副作用

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1日目	
自覚症状	発熱																
	食欲不振・吐き気																
	血管痛・静脈炎																
検査値	白血球減少																
	赤血球減少(貧血)																
	血小板減少																
	肝機能低下																



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。