




【カペシタビン+アバスチン療法について】



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前			作用		めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
アバスチン注	抗がん剤です	90時間																									
カペシタビン錠	抗がん剤です	朝・夕 内服																			2回目から点滴時間が短くなる場合があります。						

😊 治療による副作用

: 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目			
自覚症状	過敏症																									
	食欲不振・吐き気																									
	口内炎																									
	下痢																									
	手足症候群																									
	色素沈着																									
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																									
検査値	白血球減少																									
	赤血球減少(貧血)																									
	血小板減少																									
	肝機能低下																									



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。