



【FOLFIRI+ベクティビックス療法について】

(フルオウラシル+レボホリナート+イリノテカン+ベクティビックス)



様

コース

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	日																													
			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
イメンドカプセル	吐き気止めです	1日1回 内服	📄	📄	📄	1日目は、抗がん剤の投与開始 60~90分前 に飲んでください。										📄	📄	📄	1日目は、抗がん剤の投与開始 60~90分前 に飲んでください。													
ベクティビックス注	抗がん剤です	1時間	📄	📄	📄											📄	📄	📄											📄	📄	📄	📄
グラニセトン注	吐き気止めです	30分	📄																													
デキサドロン錠	吐き気止めです	朝・夕 内服		📄	📄	📄	📄	1回4錠										📄	📄	📄	1回4錠											
イリノテカン注	抗がん剤です	2時間	📄																													
レボホリナート注	5-FUの効果を強める薬です		📄																													
フルオウラシル注	抗がん剤です	約5分	📄																													
フルオウラシル持続)	抗がん剤です	46時間	📄																													

😊 治療による副作用

: 注意が必要な時期

		日																											
		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
自覚症状	食欲不振・吐き気	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																											
	口内炎	口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。																											
	下痢	便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水のような便が出るときはお知らせ下さい。																											
	色素沈着	肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。																											
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)	髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配すぎないでください。																											
	皮膚症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など)	にきびのような発疹が起きたり、皮膚が乾燥してひび割れができることがあるので、保湿剤を使うなどして予防しましょう。																											
検査値	白血球減少	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																											
	赤血球減少(貧血)	貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																											
	血小板減少	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																											



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

