【FOLFIRI＋アービタックス療法について】

（5-FU＋レボホリナート＋イリノテカン＋アービタックス）

様　　コース目

お薬の名前と治療のスケジュール（副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。）

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
イメンドカプセル	吐き気止めです	1日1回　内服	💊	💊	💊												💊	💊	💊												💊
デカドロン注	アレルギー様症状を抑える薬です	30分	💉							💉							💉							💉							💉
レスタミン錠		1日1回　内服	5錠							5錠							5錠							5錠							5錠
アービタックス注	抗がん剤です	2時間	💉							💉							💉							💉							💉
グラニセトロン注	吐き気止めです	30分	💉														💉														💉
デカドロン錠	吐き気止めです	朝・夕　内服		💊	💊	1回4錠												💊	💊	1回4錠											
イリノテカン注	抗がん剤です	2時間	💉														💉														💉
レボホリナート注	5-FUの効果を強める薬です		💉														💉														💉
5-FU注	抗がん剤です	約5分	💉														💉														💉
5-FU注（持続）	抗がん剤です	46時間	←→														←→														←

1日目は、抗がん剤の投与開始60～90分前に飲んでください。

2回目から点滴時間が短くなることがあります。

1日目は、抗がん剤の投与開始60～90分前に飲んでください。

治療による副作用

：注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
自覚症状	アレルギー様症状																													
		発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																												
	食欲不振・吐き気																													
		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																												
	口内炎																													
		口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。																												
	下痢																													
		便の回数が多くなったり強い腹痛をともなったり、水の様な便が出るときはお知らせ下さい。																												
	色素沈着																													
		肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。																												
	脱毛（頭髪・まつ毛・眉毛など）																													
		髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																												
	皮膚症状（皮疹、乾燥、爪囲炎など）																													
		にきびのような発疹ができたり、皮膚が乾燥してひび割れができることがあるので、保湿剤を使うなどして予防しましょう。																												
検査値	白血球減少																													
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																												
	赤血球減少(貧血)																													
		貧血の症状（めまい・ふらつき）がでたりします。転倒に注意しましょう。																												
	血小板減少																													
		出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																												

＊注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
＊上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
＊それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
＊何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

岩手県立大船渡病院薬剤科