




【mFOLFOX6+ベクティビックス療法について】

(フルオウラシル+レボホリナート+オキサリプラチン+ベクティビックス)



様



コース

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強が残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前			作用			めやすの時間			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
イメドカプセル	吐き気止めです	1日1回 内服																																					
ベクティビックス注	抗がん剤です	1時間				1日目は、抗がん剤の投与開始 60~90分前 に飲んでください。																																	
アロキシ注 デキサート注	吐き気止めです	30分																																					
デカドロン錠	吐き気止めです	朝・夕 内服					1回4錠																																
オキサリプラチン注	抗がん剤です	2時間																																					
レボホリナート注	5-FUの効果を強める薬です																																						
フルオウラシル注	抗がん剤です	約5分																																					
フルオウラシル(持続)	抗がん剤です	46時間																																					

😊 **治療による副作用**

: 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
自覚症状	過敏症																																				
	食欲不振・吐き気																																				
	手足のしびれ																																				
	口内炎																																				
	色素沈着																																				
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																																				
	皮膚症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など)																																				
検査値	白血球減少																																				
	赤血球減少(貧血)																																				
	血小板減少																																				
	肝機能低下																																				

* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。



- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

劑科