



【R-THP-GOP療法について】
(リツキサン+テラルピシン+エンドキサン+オンコピン+プレドニン)



様 コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

| 薬の名前 | | 作用 | めやすの時間 | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1日目 |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| ナイキサン錠 | アレルギー様症状を抑える薬です | 1日1回 内服 | 1日1回 内服 | 1回1錠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ボラミン注 | 抗がん剤です | 3~5時間 | 3~5時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リツキサン注 | 吐き気止めです | 30分 | 30分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テラルピシン注 | 抗がん剤です | 30分 | 30分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オンコピン注 | 抗がん剤です | 30分 | 30分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エンドキサン注 | 抗がん剤です | 30分 | 30分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プレドニン錠 | ステロイドです | 朝・昼 内服 | 朝・昼 内服 | 朝5錠、昼5錠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

この週はお休みです。

この週はお休みです。

尿が赤くなることがあります。

胃を荒らすことがありますので胃薬(ファモチジン)も一緒に飲みます。免疫が低下しますので、手洗い・うがいを心がけましょう。

😊 **治療による副作用**

| | | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1日目 |
|------|-----------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 自覚症状 | アレルギー様症状 | 発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 食欲不振・吐き気 | 食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不眠 | 寝つきが悪くなる時があります。症状があるときはお知らせください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 胃部不快感 | 胃の痛みやゲップ、むかつき、腹部膨満感、食欲がないなど、気になる症状があるときはお知らせください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 出血性膀胱炎(血尿・排尿痛) | 排尿時の不快感、尿に血が混ざるなどの症状があるときはお知らせください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 口内炎 | 口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 便秘 | 水分を多めに摂りましょう。続く場合はお薬で調節した方が良いので、お知らせ下さい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 手足のしびれ | 手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査値 | 脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など) | 髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 白血球減少 | 感染しやすくなりますので、手洗い・うがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 赤血球減少(貧血) | 貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 血小板減少 | 出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。