



【mFOLFOX6療法について】

(フルオロウラシル+レボホリナート+オキサリプラチン)



様



コース目

☺ **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28																												1日目
イメドカプセル	吐き気止めです	1日1回 内服	☯	☯	☯	1日目は、抗がん剤の投与開始 60~90分前に飲んでください。										☯	☯	☯	1日目は、抗がん剤の投与開始 60~90分前に飲んでください。										☯		
グラニセトン注	吐き気止めです	30分	☯			1回1錠										☯			1回8錠										☯		
デカドロン錠	吐き気止めです	朝 昼 内服		☯	☯	この週は お休みです。											☯	☯	この週は お休みです。												
オキサリプラチン注	抗がん剤です	2時間	☯			この週は お休みです。										☯			この週は お休みです。										☯		
レボホリナート注	フルオロウラシルの効果 を高める薬です		☯													☯													☯		
フルオロウラシル注	抗がん剤です	約5分	☯													☯													☯		
フルオロウラシル注	抗がん剤です	46時間	☯	☯												☯	☯												☯		

☺ 治療による副作用

注意が必要な時期

		1日目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28																												1日目
自覚症状	過敏症	痒みや顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																												
	食欲不振・吐き気	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																												
	口内炎	口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。																												
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)	髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																												
	手足のしびれ	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。冷たい物に触れないようにしましょう。 予防のための漢方薬があります																												
検査値	白血球減少	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																												
	赤血球減少(貧血)	貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																												
	血小板減少	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																												
	肝機能低下	体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなるがあります。																												



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

