



# 【AC療法について】 (ドキシソルビシン+エンドキサン)



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

| 薬の名前               | 作用      | めやすの時間  | 1日目 | 2                | 3 | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1日目 |  |  |  |
|--------------------|---------|---------|-----|------------------|---|--|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|--|--|
|                    |         |         |     |                  |   |  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
| イモドカプセル            | 吐き気予防です | 1日1回 内服 |     |                  |   | 1日目は、抗がん剤の投与開始<br><b>60~90分前</b> に飲んでください。 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
| デカドロン錠             | 吐き気予防です | 朝・昼 内服  |     |                  |   |  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
| アロキシ静注バッグ<br>デキサー注 | 吐き気予防です | 30分     |     |                  |   |  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
| ドキシソルビシン注          | 抗がん剤です  | 15分     |     | 尿の色が赤くなることがあります。 |   |  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |
| エンドキサン注            | 抗がん剤です  | 30分     |     |                  |   |  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |

## 😊 治療による副作用

:注意が必要な時期

|      |                 | 1日目   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1日目 |
|------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 自覚症状 | 食欲不振・吐き気        | 食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|      | 出血性膀胱炎(血尿・排尿痛)  | 排尿時の不快感、尿に血が混ざるなどの症状があるときはお知らせください。                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|      | 口内炎             | 口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|      | 色素沈着            | 肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|      | 脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など) | 髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| 検査値  | 白血球減少           | 感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|      | 赤血球減少(貧血)       | 貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|      | 血小板減少           | 出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。