




【ddAC療法について】
(ドキシソビシン+エンドキサン)



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

| 薬の名前 | 作用 | めやすの時間 | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1日目 |
|---------------------|---------|---------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イメンドカプセル | 吐き気予防です | 1日1回 内服 | | | | | | | | | | | | | | | |
| デカドロン錠 | 吐き気予防です | 朝・昼 内服 | | | | | | | | | | | | | | | |
| アロキシ静注バッグ デキサート注 | 吐き気予防です | 30分 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドキシソビシン注 | 抗がん剤です | 15分 | | | | | | | | | | | | | | | |
| エンドキサン注 | 抗がん剤です | 30分 | | | | | | | | | | | | | | | |

1日目は、抗がん剤の投与開始
60~90分前に飲んでください。

この週は
お休みです。

尿の色が赤くなることがあります。

😊 **治療による副作用**

| | | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1日目 | |
|------|-----------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|-----|--|
| 自覚症状 | 食欲不振・吐き気 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 出血性膀胱炎(血尿・排尿痛) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 口内炎 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 色素沈着 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査値 | 白血球減少 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 赤血球減少(貧血) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 血小板減少 | | | | | | | | | | | | | | | | |

心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。